


T. 1 – La estadística inferencial: algunos conceptos previos

1. Teoría de la Probabilidad

2. Variables aleatorias

3. La selección de la muestra

• La importancia de la Teoría de la Probabilidad en el ámbito de la estadística se deriva del hecho de constituir ésta uno de los pilares teóricos fundamentales sobre los que se asienta el desarrollo y aplicación de la Estadística Inferencial. Así, mientras que si de una o más variables conocemos sus características (tendencia central, dispersión, asociación...) en la población, la Teoría de la Probabilidad nos permite establecer predicciones de las características que esas variables adoptarán en una muestra de sujetos extraída al azar de esa población, la estadística inferencial -basándose en el conocimiento desarrollado por la Teoría de la Probabilidad en ese camino de la población a la muestra- ha establecido las bases para trazar el camino opuesto, esto es, inferir a partir de los datos de una muestra en una o más variables, cómo serán las características (tendencia central, dispersión, asociación...) de esas variables en la población a la que esa muestra representa. Gráficamente:



1. Teoría de la Probabilidad

• Ante un evento de resultado incierto, el campo de conocimientos de la Teoría de la Probabilidad ha dirigido sus esfuerzos a determinar el grado en qué puede ocurrir cualquiera de los resultados posibles [sucesos] que se pueden derivar de la realización de tal evento [experimento aleatorio].

Ejemplos de evento incierto: (1) el lanzamiento de una moneda (sucesos posibles: que salga cara y que salga cruz); mi estado de salud durante el próximo mes (sucesos posibles: bueno; malo; regular); la práctica religiosa de un estudiante de la Universidad elegido al azar (sucesos posibles: ninguna; católica; protestante; etc.); el *CI* de ese mismo estudiante (sucesos posibles: que sea igual a 120; que sea igual a 85... En este último caso, los sucesos se podrían expresar, no en forma de *sucesos elementales*, sino de *sucesos compuestos*, por ejemplo: que sea menor de 110; que sea mayor o igual a 110.

• El esfuerzo de la Teoría de la Probabilidad por determinar el grado en qué puede ocurrir uno cualquiera de los sucesos asociado a un determinado experimento aleatorio se ha concretado en la asignación de un valor numérico que refleje el grado en que es previsible la ocurrencia de ese suceso. A este valor numérico se le conoce como probabilidad (P) y puede, por convención, oscilar entre 0 y 1 (0: probabilidad nula; 1: probabilidad segura). Así, para el suceso i de un experimento aleatorio X :

$$0 \leq P(X_i) \leq 1$$

Otra propiedad importante de las probabilidades es que, para los distintos (n) sucesos elementales asociados a un experimento aleatorio, la suma de sus probabilidades será igual a 1:

$$\sum_{i=1}^n P(X_i) = 1$$

• A continuación se van a describir 3 enfoques en la estimación de las probabilidades asociadas a los resultados posibles de un evento incierto. Dado que normalmente estos enfoques lo que permiten obtener son estimaciones, no los verdaderos valores de probabilidad, haremos referencia a estos valores estimados con el símbolo P' , mientras que para el verdadero valor de probabilidad se reserva el símbolo P .

(1) Enfoque subjetivo: supone estimar la probabilidad de un suceso en función del grado de confianza personal que se tiene acerca de la ocurrencia del mismo, ya venga esa confianza determinada por nuestra experiencia vital, por nuestras convicciones personales o creencias, o por cualquier otra fuente sobre la que se base el conocimiento que tenemos de nuestro medio. Se trata del procedimiento más utilizado en la práctica desde siempre a la hora de estimar probabilidades, especialmente, cuando no se tienen ciertas nociones sobre otras aproximaciones al cálculo de probabilidades, o bien, cuando aplicar éstas resulta poco operativo. Por ejemplo, cuando me asomo a la ventana antes de salir de casa y veo el cielo, realizo una estimación de la probabilidad de que llueva durante el día. Y como consecuencia de esa estimación, y dependiendo de lo que me importe mojarme, decido qué ponerme o si coger un paraguas. En realidad, hacemos este tipo de estimaciones subjetivas de probabilidad en muchas ocasiones, aunque no siempre de forma muy consciente, constituyendo un elemento determinante de las decisiones que finalmente tomamos.

Ejemplos de estimación subjetiva de probabilidad: (1) a la hora de estimar la probabilidad de que al lanzar dos dados salgan en ambos un seis, muchas personas realizarían una estimación subjetiva de la misma pues, aunque existen otras aproximaciones más precisas a la hora de realizar esa estimación, su aplicación es desconocida para muchos; (2) también las personas suelen realizar estimaciones subjetivas de la probabilidad de que les toque el ‘gordo’ en un sorteo de lotería -en general, muy al alza- y, curiosamente, suelen ser estimaciones diferentes en función del número considerado; (3) también es habitual realizar estimaciones subjetivas de la probabilidad respecto al resultado de un partido, por ejemplo, de que gane el Valencia CF en su partido del próximo fin de semana.

(2) Enfoque clásico o a priori: consiste en estimar la probabilidad de un suceso (X_i) como la razón entre los resultados favorables a ese suceso y el número total de resultados posibles que se pueden dar en la realización del experimento aleatorio.

$$P'(X_i) = \frac{n^\circ \text{ de resultados favorables}}{n^\circ \text{ de resultados posibles}}$$

Ejemplo: ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga un 5?

$$P'(X_i = 5) = \frac{1}{6} = 0,167$$

Ejercicio 1: ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga un 3?; ¿y de que salga número par?; ¿y de que al lanzar dos dados, la suma de los puntos dé igual a 7?; ¿y de que en la lotería de Navidad toque el *gordo* en el número al que juego?

Este enfoque en la estimación de probabilidades asume el conocido como principio de indiferencia, esto es, que la probabilidad de ocurrencia de todos los sucesos es la misma. Si se cumple este supuesto en la realización de un determinado experimento aleatorio, entonces podremos decir que las estimaciones realizadas de acuerdo a esta aproximación serán los verdaderos valores de probabilidad. Sin embargo, el cumplimiento de este principio resulta difícil de aceptar en muchas situaciones en la práctica. Por ejemplo, si aplicamos la aproximación clásica a la hora de estimar la probabilidad de que un estudiante elegido al azar de la Universidad su estado civil sea viudo/a, nos daría igual a $\frac{1}{4}$, un resultado poco creíble pero que ha venido motivado por realizar la estimación no cumpliéndose en este caso el principio de indiferencia.

En algunos casos sí que se puede asumir el cumplimiento de este principio -por ejemplo, en juegos de azar-, pero en otros muchos casos puede tenerse serias dudas acerca de la satisfacción del mismo, lo cual cuestionaría la aplicación de este enfoque.

(3) Enfoque frecuencialista, a posteriori o estadístico: dado un suceso X_i asociado a la realización de un determinado experimento aleatorio, la estimación de la probabilidad de X_i a partir de este enfoque se basa en la repetición de una gran cantidad de veces del experimento aleatorio en las mismas condiciones, para así obtener la razón entre el nº de veces que ha ocurrido ese suceso (n_i) y el nº de repeticiones del experimento (n):

$$P'(X_i) = \frac{n_i}{n}$$

Ejercicio 2: ¿cómo se estimaría la probabilidad, de acuerdo a esta aproximación, de que salga un 3 en el lanzamiento de un dado?, ¿y del resto de sucesos planteados en el ejercicio 1?

De acuerdo al enfoque frecuencialista, cuanto mayor sea el número de repeticiones del experimento aleatorio, más cercano será el valor de probabilidad estimado ($P'(X_i)$) al verdadero valor de probabilidad $P(X_i)$. En términos matemáticos:

$$P(X_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_i}{n}$$

Ejemplo: Si lanzamos una moneda 10 veces a fin de estimar la probabilidad de que salga cara, la probabilidad estimada podría ser, por ejemplo, $P'(\text{cara}) = 0,6$ si nos salieran 6 caras y 4 cruces en esos 10 lanzamientos. Sin embargo, a medida que aumenta el número de lanzamientos (idealmente, hasta infinito) esta estimación se irá acercando a la probabilidad verdadera. Se supone que ese valor será igual a 0,5, pero no tiene por qué necesariamente ser así ya que la moneda podría tener algún tipo de curvatura o ser más pesada por alguno de los dos lados.

Si nos fijamos en la fórmula de la aproximación frecuencionalista, la estimación de la probabilidad de un suceso se corresponde con la fórmula de la frecuencia relativa o proporción (p_i) que vimos al construir una distribución de frecuencias:

$$P'(X_i) = p_i$$

En realidad, cualquiera de las variables vistas en los ejemplos de los temas precedentes puede contemplarse como la repetición de un experimento aleatorio concreto, pues consiste en la medición de un atributo determinado en múltiples ocasiones -tantas como diferentes sujetos sean medidos-, sin tener certidumbre a priori de cuál van a ser los valores resultantes (sucesos) de esas mediciones. Y de acuerdo a la aproximación frecuencionalista de la probabilidad, las frecuencias relativas que se obtengan al calcular la distribución de frecuencias de esa variable, representarán la estimación de las probabilidades asociadas a esos valores de la variable (experimento aleatorio).

Ejemplo: Queremos estimar la probabilidad de estar casado ($X_i = \text{casado}$) dentro de los estudiantes de la UVEG y disponemos de una muestra de 500 estudiantes de dicha universidad:

- Experimento aleatorio: obtener información del estado civil de un estudiante de la UVEG.
- Repeticiones del experimento aleatorio: se pregunta a 500 estudiantes ($n = 500$).
- N° de ocurrencias del suceso de interés: n° de estudiantes casados en esa muestra, supongamos que son 60 ($n_{\text{casado}} = 60$).
- $P'(X = \text{casado}) = 60/500 = 0,12$. Esta estimación se aproximará a la probabilidad verdadera cuanto mayor sea el n° de repeticiones, en este caso, el tamaño de la muestra. Se considerarán como los verdaderos valores de probabilidad en el caso en que se cuente con datos para todos los elementos de la población.

Ejercicio 3 (adaptado a partir de ejemplo de Barón-López, 2005): Se ha repetido en 1000 ocasiones el experimento de elegir a una mujer de la población española de mujeres de entre 45 y 55 años, obteniéndose datos de las variables “Nivel de masa ósea” [*NO*: normal; *OE*: Osteopenia; *OO*: Osteoporosis (Clasificación de la *OMS*)] y “Haber pasado la menopausia” [*N*: No; *S*: Sí]. Los datos obtenidos se muestran resumidos en la siguiente tabla de contingencia:

		MENOPAUSIA		Total
		NO	SI	
CLASIFICACION OMS	NORMAL	189	280	469
	OSTEOPENIA	108	359	467
	OSTEOPOROSIS	6	58	64
Total		303	697	1000

A partir de los datos recogidos, contéstese a las siguientes cuestiones (entre corchetes aparece el equivalente de la cuestión expresado de forma simbólica):

- ¿Cuál es la probabilidad (estimada) de que una mujer (extraída al azar de la población española de mujeres de entre 45 y 55 años) tenga osteoporosis? [$P(OO)$]
- ¿y de que no haya pasado la menopausia? [$P(N)$]
- ¿y de tenga osteopenia u osteoporosis? [$P(OEUOO)$]
- ¿y de que no haya pasado la menopausia y tenga osteoporosis? [$P(N \cap OO)$]
- ¿y de que tenga osteoporosis si sabemos que no ha pasado la menopausia? [$P(OO|N)$]
- Conociendo que una mujer tiene osteopenia ¿cuál es la probabilidad estimada de que haya pasado la menopausia? [$P(S|OO)$]

En este ejercicio se plantea la aplicación práctica de alguno de los teoremas básicos de la probabilidad (más detalles sobre los mismos en, por ejemplo, Botella y cols. (2001, tema 12):

- probabilidad de la intersección de dos sucesos: $P(A \cap B)$
- probabilidad de la unión de dos sucesos: $P(A \cup B)$
- probabilidad condicional: $P(B|A)$ o $P(A|B)$

2. Variables aleatorias

• Frente al concepto de variable estadística, el concepto de variable aleatoria supone contar con información de la probabilidad asociada a cada una de las modalidades de la variable, lo cual implica contar con datos para la población pues, en otro caso, lo que tendríamos serían frecuencias relativas, esto es, estimaciones de las probabilidades, no las probabilidades en sí.

Ejemplo: Si medimos la variable “estado civil” en toda la población de estudiantes de la UVEG ($n = 45000$) y obtenemos que 350 son viudos, entonces la frecuencia relativa correspondiente a la modalidad ‘ser viudo’ ($p_{\text{viudo}} = 350/45000 = 0,008$) será precisamente la probabilidad de ‘ser viudo’ (P_{viudo}) en la población de estudiantes de la UVEG, y no una estimación de la misma. Análogamente, si obtenemos las probabilidades asociadas a las otras modalidades (sucesos) de la variable estado civil, tendremos la distribución de probabilidades asociada a esta variable en la citada población:

X_i	$P(X_i)$
soltero/a	0,884
casado/a	0,105
separado/a	0,009
viudo/a	0,002
	1,00

• La distribución de probabilidad de una variable aleatoria -de forma análoga a la distribución de frecuencias de una variable estadística- consiste en la correspondencia entre los distintos valores que toma la variable y las probabilidades asociadas a esos valores.

- A esa correspondencia entre las modalidades de una variable y sus probabilidades se le suele llamar función de probabilidad en el caso de tratarse de una variable aleatoria discreta (variables categóricas, ordinales o cuantitativas discretas) y función de densidad de probabilidad en el caso de que sea continua (variables cuantitativas continuas).

Ejemplo: función de probabilidad correspondiente a la variable ‘Nº de contratos laborales en los 2 últimos años’ para la población de personas en edad laboral de la comarca del Camp de Morvedre:

X_i	$P(X_i)$
0	0,08
1	0,31
2	0,35
3	0,18
4	0,07
5	0,01

1

- Y se llama función de distribución, ya sea la variable ordinal o cuantitativa, a la que hace corresponder a cada valor de la variable, la probabilidad de que se dé un valor como ese o inferior (concepto análogo al de frecuencia relativa acumulada). Este concepto no es aplicable si la variable es categórica.

Ejemplo: función de distribución para el ejemplo anterior:

X_i	$P_a(X_i)$
0	0,08
1	0,39
2	0,74
3	0,92
4	0,99
5	1

- La distribución de probabilidad de una variable no suele ser conocida dado que, normalmente, no es factible contar con los datos de todas las entidades de la población de interés para una determinada variable- Una aproximación a la misma consiste en estimar las probabilidades correspondientes a partir de los datos recogidos para una muestra de esa población y la aplicación de la aproximación frecuencialista al cálculo de probabilidades presentada antes. Otra vía de aproximación a la distribución de probabilidad de una variable supone asumir, atendiendo a razones sustantivas o a la experiencia práctica acumulada, que dicha variable se distribuye de acuerdo a algún modelo teórico de características conocidas, tal como algunos de los que se presentarán en la siguiente sección.
- Cuando se obtiene un índice cualquiera -por ejemplo, la media- a partir de la distribución de probabilidad de una variable, al valor resultante se le denomina parámetro (mientras que si fuera a partir de una distribución de frecuencias, sería un estadístico).

- Se suelen utilizar letras griegas minúsculas para representar a los parámetros. Así, por ejemplo, dada una variable X , se utiliza μ_X para representar la media, σ_X para la desviación típica, π_X para la proporción... Es lo mismo para el caso de los índices estadísticos bivariados, por ejemplo, σ_{XY} para la covarianza, ρ_{XY} para el coeficiente de correlación de Pearson, α para la constante de la ecuación de regresión... Hay algún caso especial, siendo el más notable el de la media aritmética que, como parámetro, aparece también representada como $E(X)$ y denominada, de forma alternativa, como ‘valor esperado’ y también ‘esperanza matemática’. Por último, para algunos índices no existe doble asignación simbólica en función de que se traten de parámetros o de estadísticos, sea el caso de la mediana (Md) o el coeficiente de variación (CV), entre otros muchos.
- La aplicación sobre la distribución de probabilidad de una variable aleatoria de los índices de tendencia central, dispersión, etc. presentados en temas previos, así como los que se van a presentar en temas sucesivos, implica ciertas adaptaciones en las fórmulas presentadas para los mismos. A título ilustrativo, se muestran a continuación las de la media (valor esperado) y la varianza para el caso en que la variable sea ordinal o cuantitativa discreta:

$$E(X) = \mu_X = \sum X_i \cdot P(X_i)$$

$$\sigma_X^2 = \sum (X_i - \mu_X)^2 \cdot P(X_i)$$

Ejercicio 4: Obtener a partir del ejemplo presentado antes de la distribución de probabilidad de la variable “Nº de contratos laborales en los 2 últimos años”:

1. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar de la población anterior haya tenido 3 contratos en los 2 últimos años?
2. ¿Y de que haya tenido más de 2 contratos?
3. Obtener la mediana y la moda de la variable.
4. Obtener el valor esperado (media) y la varianza de la variable.

Ejercicio 5: Sea el caso que contamos con datos de dos variables aleatorias en la población de trabajadores del sector de la construcción de Gandía ($n = 1000$): “Nº accidentes laborales en el último año” (X) y “Tipo de contrato” (Y) [Fijo; Temporal]:

Y_j	X_i	0	1	2	3	
Fijo		250	90	50	40	430
Temporal		150	160	160	100	570
		400	250	210	140	1000

1. Obtener la distribución de probabilidad (función de probabilidad) de la variable X [$P(X_i)$]
2. Obtener la función de distribución de X [$P_a(X_i)$]
3. Obtener la distribución de probabilidad conjunta de ambas variables [$P(X_i, Y_j)$]
4. ¿Cuál es la probabilidad de que un trabajador (extraído al azar de dicha población)...
 - a. haya tenido 1 o más accidentes? [$P(X \geq 1)$]
 - b. tenga contrato fijo y haya tenido 0 accidentes? [$P(\text{Fijo} \cap 0)$]
 - c. haya tenido 2 o 3 accidentes? [$P(2 \cup 3)$]
 - d. tenga un contrato fijo? [$P(\text{Fijo})$]
 - e. haya tenido 0 accidentes, sabiendo que tiene un contrato fijo? [$P(0/\text{Fijo})$]
5. Obtener la moda, la mediana, la esperanza matemática y la varianza de la variable X .

- La siguiente tabla resume algunos de los conceptos planteados hasta ahora en función de que hagan referencia a una muestra o a una población:

MUESTRA	POBLACIÓN
1. Variable estadística	1. Variable aleatoria
2. Frecuencia relativa (p_i)	2. Probabilidad [$P(X_i)$]
3. Distribución de frecuencias relativas	3. Distribución de probabilidad - Dos tipos: Función de probabilidad Función de densidad de probabilidad
4. Frecuencia relativa acumulada (p_a)	4. Probabilidad acumulada [$P_a(X_i)$]
5. Distribución de frec. relativas acumuladas	5. Función de distribución
6. Estadísticos	6. Parámetros

3. La selección de la muestra

- Condición para que a partir de la información contenida en una muestra se puedan describir las propiedades de la población:

→ Que la muestra sea representativa de esa población.

- Pero, ¿qué significa en la práctica que una muestra sea representativa de una población?

Que las propiedades que caracterizan a la población se distribuyan de forma análoga en la muestra. Por ejemplo, sea la población los estudiantes de la Facultad: si el 25% son de primero (y así...), que en la muestra ídem; si en la población la mitad son varones y la otra mitad mujeres, pues en la muestra ídem.; etc.

- Factores que van a determinar la representatividad de una muestra:

- (1) El procedimiento de selección de los elementos de la población.
- (2) El tamaño de la muestra.
- (3) El contenido de la investigación.

3.1. Respecto al procedimiento de selección de los elementos de la población.

- Muestreo: conjunto de técnicas asociadas a la selección de una muestra de una población.
- Subrayar que el muestreo no es algo exclusivo de la estadística; es, en realidad, una estrategia muy utilizada en la vida cotidiana. El conocimiento que nos formamos del mundo está con frecuencia basado en el muestreo, y es razonable que así lo hagamos por economía de recursos. A modo de ejemplo, la cata de una cucharada de un guiso que estamos realizando es una forma de muestreo del guiso. Ello nos va a permitir tener una idea del sabor del mismo sin tener que probarlo todo.
- Existen diferentes procedimientos o técnicas que satisfacen -con mayor o menor éxito- los dos objetivos que podemos considerar básicos del muestreo: (1) obtener una muestra que sea tan representativa de la población como sea posible; y (2) plantear una forma de recogida de datos que se ajuste a los recursos (económicos, temporales...) con que se cuente.
- A las distintas estrategias que se puede seguir en la selección de los elementos de una población se les conoce como técnicas de muestreo, existiendo un extenso repertorio de ellas, algunas de gran sofisticación. Entorno a su estudio y aplicación se ha desarrollado un área de conocimiento conocida como Teoría del Muestreo.
- En términos matemáticos, ¿la satisfacción de qué criterio va a determinar la selección de una muestra representativa?
 - El que todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de formar parte de la muestra o, si no la misma, que sea conocida esa probabilidad para todos los elementos de la población.
- A las técnicas de muestreo que satisfacen el criterio anteriormente planteado se les conoce como técnicas de muestreo probabilístico, siendo la más conocida por su sencillez y eficacia, el muestreo

aleatorio simple. Algunas variantes de la anterior de mayor utilización en la práctica son el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo por conglomerados.


El muestreo aleatorio simple (m.a.s.)

- Los elementos de la muestra son elegidos al azar de entre todos los de la población. Utilizando este procedimiento, todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra.
- Requiere la identificación y listado de todos los elementos de la población, algo no siempre factible, por lo que su utilización resulta limitada en la práctica.

El muestreo aleatorio estratificado

- Supone forzar que, para una determinada variable(s), se mantenga en la muestra la misma distribución que la misma tiene en la población. Por ejemplo, si en la población de estudiantes de la UVEG hay un 60% de mujeres y un 40% de varones, en una muestra de la misma se forzaría para que se mantuviesen esos porcentajes. Se llaman estratos a las categorías de la variable en función de la que se estratifique el muestreo –mujeres y varones para la variable sexo, en nuestro ejemplo. Por supuesto, cada elemento de la población debe pertenecer a un único estrato.
- Pasos principales: determinar la proporción de cada estrato en la población para la variable de estratificación; fijar el número de elementos que se deben seleccionar de cada estrato en la muestra (afijación); extraer mediante m.a.s. de cada estrato de la población el nº de casos establecido en el paso anterior.

Ejemplo de aplicación del muestreo aleatorio estratificado en la obtención de una muestra ($n = 1000$) de la población de estudiantes de la ESO en la Comunitat Valenciana (CV) a fin de realizar un estudio sobre la incidencia de la violencia en este tipo de centros:



El muestreo por conglomerados

- Se trata de una forma de m.a.s. en que la unidad de muestreo no son los elementos de la población, sino agrupaciones de éstos que de forma natural existan en aquélla (conglomerados), por ejemplo, colegios, hospitales, distritos postales, calles de una población, secciones del censo electoral...
 - Supone seleccionar al azar uno o más conglomerados, recogiendo datos de todos los elementos de esos conglomerados.
 - Suele resultar mucho más fácil acceder a las unidades de los conglomerados, normalmente próximos entre sí, que a elementos individuales dispersos geográficamente.
- Existen algunas técnicas de muestreo no probabilístico, como es el caso del muestreo accidental (o casual), el muestreo intencional y el muestreo por cuotas que, aunque no cumplen los requisitos del muestreo probabilístico, son utilizadas con frecuencia en la práctica debido a la mayor facilidad de aplicación de las mismas.
 - Los diferentes procedimientos de muestreo anteriores no son excluyentes, se puede secuenciar la utilización de diferentes técnicas de muestreo dando lugar a lo que se conoce como un muestreo polietápico. Un ejemplo típico es el muestreo polietápico conglomerados/m.a.s., esto es, en primer lugar se aplica un muestreo por conglomerados y, a continuación, se lleva a cabo un m.a.s. de los elementos dentro de cada conglomerado. Por supuesto, otras combinaciones son posibles, así como la consideración de más de dos etapas.
 - Si en una investigación la muestra es representativa de la población, es lícito generalizar los resultados obtenidos en la muestra a la población origen y se dice entonces, en términos metodológicos, que la investigación tiene validez externa.

Ejercicio 6: ¿Qué técnica de muestreo fue aplicada en los siguientes ejemplos?

1. Se solicita a las personas que entran y salen a un centro comercial que contestan a una serie de cuestiones relativas a un estudio sobre comunicación social.
2. De entre los asegurados de una compañía de seguros se selecciona al azar a 500 de ellos, a los que se envía una carta con un cuestionario para evaluar una campaña de seguridad promovida por esa compañía entre sus asegurados.
3. Un estudiante realiza una encuesta con el fin de explorar las actitudes solidarias de los alumnos de psicología de su facultad. Sabe a partir de un estudio previo que, de los estudiantes de su facultad, el 25% está comprometido con alguna ONG, mientras que el 75% restante no lo está. Así, decide seleccionar al azar a 200 estudiantes, 50 de entre los comprometidos con una ONG y 150 de entre los que no.
4. En un estudio que pretende poner de manifiesto la influencia de la deseabilidad social al contestar tests psicológicos, el investigador pasa a sus conocidos y familiares una serie de cuestionarios.
5. Un psicólogo está interesado en explorar los hábitos de sociabilidad de las personas de la tercera edad que viven en residencias. Para ello, obtiene una muestra aleatoria de diez residencias de su comunidad autónoma y en cada una de ellas selecciona al azar a 30 personas.
6. En un estudio a nivel nacional sobre las estrategias de aprendizaje de estudiantes de la ESO se seleccionan al azar a 30 centros y dentro de éstos a 4 grupos de cada centro, realizándose una entrevista a todos los estudiantes de los grupos seleccionados.
7. En la realización del censo en España.

3.2. Respecto al tamaño de la muestra

- Obviamente, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra mayor será la probabilidad de que ésta sea representativa de la población, sin embargo, no hay que olvidar que también será mayor el esfuerzo implicado en la recogida de los datos y, por lo tanto, se perderá la principal ventaja inherente al muestreo: la economía de recursos a la hora de obtener los datos.
- Criterios orientativos a la hora de definir el tamaño muestral:
 - 1) Un primer criterio determinante en la práctica es el de la cantidad de recursos con que se cuenta para llevar a cabo la recogida de los datos.
 - 2) Un segundo criterio viene determinado por el margen de error que estamos dispuestos a asumir en nuestras inferencias (el error muestral) y por el nivel de confianza con que se establecerán esas inferencias.

Este segundo criterio puede concretarse a través de fórmulas específicas que permiten obtener el tamaño muestral en función de esos dos criterios, si bien, otros aspectos suelen aparecer implicados en la aplicación de esas fórmulas:

- el tamaño de la población;
- el índice estadístico que vaya a aplicarse (pero, ¿cuál de todos?);
- el valor del índice estadístico en la población para la variable objeto de interés (- “¿en la población?, pero si eso es precisamente lo que queremos conocer...”) (¿variable objeto de interés?, en mi estudio no tengo una única variable objeto de interés...”).

• A fin de facilitar los cálculos en la aplicación de la citada fórmula, diversos autores han elaborado tablas que, para un índice estadístico concreto, para un valor concreto del mismo en la población, y para un nivel de confianza determinado (habitualmente, el 95 o el 99%), permiten obtener el valor del tamaño muestral a considerar en función de los dos criterios restantes: el tamaño de la población y el valor de error muestral que se está dispuesto a asumir.

Ejemplo: La tabla que aparece a continuación permite obtener el tamaño de la muestra que deberemos considerar en la recogida de datos para el caso en que se vaya a aplicar el estadístico de la proporción y que, además, se asuma que el valor de ese estadístico en la población para la variable objeto de interés es 0,5 ($\pi = 0,5$) y un nivel de confianza del 95%.

Un caso concreto:, ¿cuál sería el tamaño de la muestra a considerar en un estudio en que se quiere conocer la proporción (porcentaje) de la población española que está a favor de algún tipo de selectividad para acceder a la Universidad, asumiendo un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 2%?

POBLACIÓN	Errores muestrales					
	±1%	±2%	±3%	±4%	±5%	±10%
500	—	—	—	—	222	83
1.000	—	—	—	385	286	91
2.500	—	1.250	769	500	345	96
5.000	—	1.667	909	556	370	98
10.000	5.000	2.000	1.000	588	385	99
25.000	7.143	2.273	1.064	610	394	100
50.000	8.333	2.381	1.087	617	397	100
100.000	9.091	2.439	1.099	621	398	100
infinito	10.000	2.500	1.111	625	400	100

Estos datos están tomados de las tablas publicadas por Arkin y Colton (1962).

3.3. Respecto al contenido de la investigación

- Una premisa básica cuando se trabaja con una muestra a fin de hacer inferencias acerca de una población es que la muestra sea representativa de esa población. Ahora bien, ¿esa representatividad debe darse para todas y cada una de las variables que caracterizan a la población?
- Una condición menos exigente de representatividad, que puede ser considerada razonable en la práctica, es que la representatividad de la muestra lo sea para aquellas variables realmente relevantes en el estudio que se plantee, pero no necesariamente para aquéllas que se considere que no tengan ningún tipo de influencia sobre aquello que se vaya a estudiar.
- La contestación a las dos siguientes cuestiones va a ayudarnos a contrastar si se satisface esta condición en el caso de un muestreo no probabilístico:
 - ¿En qué es diferente mi muestra de lo que sería una muestra representativa?
 - En caso de considerarse la existencia de diferencias, ¿pueden éstas tener repercusión sobre la(s) variable(s) que se va a medir en mi estudio?

Por **ejemplo**, la investigación de procesos psicológicos básicos (atención, percepción,...) puede en algunos estudios no verse muy influida por el tipo de participantes en la misma.

Referencias:

- Barón-López, J. (2005). Bioestadística: métodos y aplicaciones. Apuntes y material disponible en <http://www.bioestadistica.uma.es/baron/apuntes/>
- Botella, J., León, O. G., San Martín, R. y Barriopedro, M. I. (2001). *Análisis de datos en psicología I: teoría y ejercicios*. Madrid: Pirámide.
- Arkin, H. y Colton, R. (1962). *Tables for statisticians*. Nueva York: Barnes and Noble.